



ويمان أون وايفز - الاجهاض الآمنة ب "ميستوبرول" للحمل ما قبل الأسبوع العاشر

www.womenonwaves.org
www.womenonweb.org



1

لا تكوني بوحديك! من المهم أن تكون معك شخصاً يمكن أن تساعدك في حالة الطوارئ التمر، تحتاج إلى مساعدة المستشفى أو الطبيب





2

ضعي 4 حبات (وكل واحد ل 2 ميليغرام، وكلها مع بعض تساوي 800 ميليغرام) من دواء "ميستوبرول" تحت لسانك واتركيها هناك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ولا تتلمعيها قبل ذلك.





3

بعد ذلك ب 3 ساعات و ضعي 4 حبات جديدة تحت لسانك واتركيها هناك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.



4

بعد ذلك ب 3 ساعات و ضعي 4 حبات جديدة تحت لسانك واتركيها هناك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.



ما الذي سأحس به لما يبدأ الإجهاض؟



شد العضلي

+

النزف



ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة التي يمكن أن أحس بها بسبب الدواء؟




الإسهال



التقيؤ



السخونة



وجع رأس




كيف أعرف لما من اللازم أن أذهب إلى المستشفى؟



النزف الشديد:

أنت تستخدمني أكثر من ضمانيت في ساعة واحدة عبر مدة ساعتين



السخونة الشديدة:

درجة الحرارة أكثر من 38° أو تبقي على 3 لمدة أطول من 24 ساعة



الآلم الشديد:

لمدة أطول من بعض الساعات



هل تريد المزيد من المعلومات؟ إذهبي إلى موقع

www.womenonwaves.org

أو إبعثي لنا رسالة إلكترونية تحت عنوان

info@womenonweb.org