





## ويمان أون وايفز

يمكن أن يساعد "ميستوبروول" في منع النزف ما بعد الولادة، ما يسمى بـ(أبوزت بارتميام هامورهاج) أو هذه هي طريقة لاستخدام هذا الدواء بسلامة




2.

بعد الولادة بمنطقة لا تقل على دقيقة واحدة:  
للمسي بطن الأم لتأكد بعد وجود طفل آخر (توأمان).



4.

بعد الولادة بثلاث دقائق:  
ضيق الحبل السري بخيوط نظيفة ثم إقطعه بسكين معقم،  
تاركاً الطفل على بطن أمها، وبعد ذلك إنتظري خروج  
المشيمة.




.1

بعد خروج الطفل مباشرة:  
جفّفي الطفل وضعيه على بطنه الأم، وأغطي الطفل ببطانية  
أوفوطة دافئة.

3.

بعد الولادة بمنطقة لا تقل على دقيقة واحدة:  
ضع في 3 حبات (وكل واحدة بـ 200 ميلigram) دواء "ميستوبروول" تحت لسان  
الأم، ومن اللازم أن تبقى الحبات هناك لمدة 30 دقيقة قبل أن تبتلعها الأم.



5.

بعد خروج المشيمة:  
دلكي رحم الأم من رأسه حتى يشاهد كرة جامدة حين  
تلمسه، وإفعلي ذلك كل ربع ساعة لمدة ساعتين.



إذهب إلى المستشفى مباشرة:

في حالة عدم خروج المشيمة خلال النصف ساعة الأول بعد الولادة  
أو



في حالة نزف الأم (أو استمرار نزف الأم) الشديد بعد استعمال  
الـ "ميستوبروول"

للمزيد من المعلومات، إذهب إلى موقع  
[www.womenonwaves.org](http://www.womenonwaves.org)

أو إبعثي لنا رسالة إلكترونية تحت عنوان  
[info@womenonweb.org](mailto:info@womenonweb.org)